

 **Chuyên đề 10: MŨ, LOGARIT**
**✓ Vấn đề 1: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT**
**A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI**
**PHƯƠNG TRÌNH MŨ**

**Dạng 1:** Dạng cơ bản: với  $0 < a \neq 1$

$$a^{f(x)} = b \Leftrightarrow \begin{cases} b > 0 \\ f(x) = \log_a b \end{cases}$$

**Dạng 2:** Đưa về cùng cơ số:  $a^{f(x)} = a^{g(x)}$  (1)

- Nếu  $0 < a \neq 1$ : (1)  $\Leftrightarrow f(x) = g(x)$
- Nếu  $a$  thay đổi: (1)  $\begin{cases} a > 0 \\ (a-1)[f(x)-g(x)] = 0 \end{cases}$

**Dạng 3:** Đặt ẩn phụ: Đặt  $t = a^x$ ,  $t > 0$ ; giải phương trình  $\Leftrightarrow \begin{cases} t > 0 \\ g(t) = 0 \end{cases}$

**Dạng 4:** Đoán nghiệm và chứng minh nghiệm đó duy nhất.

**PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT**

Điều kiện tồn tại  $\log_a f(x)$  là  $\begin{cases} 0 < a \neq 1 \\ f(x) > 0 \end{cases}$

**Dạng 1:**  $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a \neq 1 \\ f(x) = a^b \end{cases}$

**Dạng 2:** Đưa về cùng cơ số:  $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a \neq 1 \\ g(x) > 0 \\ f(x) = g(x) \end{cases}$

**Dạng 3:** Đặt ẩn phụ

Đặt  $t = \log_a x$  sau đó giải phương trình đại số theo  $t$

**Dạng 4:** Đoán nghiệm và chứng minh nghiệm duy nhất

**B. ĐỀ THI**
**Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2011**

Giải phương trình:  $\log_2(8-x^2) + \log_{\frac{1}{2}}(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}) - 2 = 0 \quad (x \in \mathbb{R})$

*Giải*

$$\log_2(8-x^2) + \log_{\frac{1}{2}}(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}) - 2 = 0. \text{ Điều kiện: } -1 \leq x \leq 1.$$

$$\Leftrightarrow \log_2(8-x^2) = \log_2(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}) + 2 \Leftrightarrow 8-x^2 = 4(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}) \quad (*).$$

Với  $-1 \leq x \leq 1$  thì hai vế của  $(*)$  không âm nên bình phương hai vế của  $(*)$  ta được:  $(*) \Leftrightarrow (8-x^2)^2 = 16(2+2\sqrt{1-x^2}) \Leftrightarrow (8-x^2)^2 = 32(1+\sqrt{1-x^2}) \quad (1)$ .

Đặt  $t = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow t^2 = 1-x^2 \Rightarrow x^2 = 1-t^2$ , (1) trở thành:

$$(7+t^2)^2 = 32(1+t) \Leftrightarrow t^4 + 14t^2 - 32t + 17 = 0$$

$$\Leftrightarrow (t-1)(t^3 - t^2 + 15t - 17) = 0 \Leftrightarrow (t-1)^2(t^2 + 2t + 17) = 0 \Leftrightarrow t = 1.$$

Do đó (1)  $\Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} = 1 \Leftrightarrow x = 0$  (Thỏa điều kiện  $-1 \leq x \leq 1$ ).

Vậy, phương trình đã cho có một nghiệm  $x = 0$ .

### Bài 2: CAO ĐẲNG KHỐI A, B, D NĂM 2011

$$\text{Giải bất phương trình } 4^x - 3 \cdot 2^{x+\sqrt{x^2-2x-3}} - 4^{1+\sqrt{x^2-2x-3}} > 0$$

*Giải*

$$4^x - 3 \cdot 2^{x+\sqrt{x^2-2x-3}} - 4^{1+\sqrt{x^2-2x-3}} > 0 \Leftrightarrow 2^{2x} - 3 \cdot 2^x \cdot 2^{\sqrt{x^2-2x-3}} - 4 \cdot 2^{2\sqrt{x^2-2x-3}} > 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - 3 \cdot 2^{\sqrt{x^2-2x-3}-x} - 4 \cdot 2^{2(\sqrt{x^2-2x-3}-x)} > 0 \quad (1)$$

Đặt  $t = 2^{\sqrt{x^2-2x-3}-x} > 0 \quad (*)$

$$(1) \text{ thành } 1 - 3t - 4t^2 > 0 \Leftrightarrow 4t^2 + 3t - 1 < 0 \Leftrightarrow -1 < t < \frac{1}{4}$$

$$\text{Do đó bất phương trình đã cho tương đương: } 2^{\sqrt{x^2-2x-3}-x} < \frac{1}{4} = 2^{-2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2-2x-3} - x < -2 \Leftrightarrow \sqrt{x^2-2x-3} < x-2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \Leftrightarrow 3 \leq x < \frac{7}{2}.$$

### Bài 3: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2010

$$\text{Giải phương trình } 4^{2x+\sqrt{x+2}} + 2^{x^3} = 4^{2+\sqrt{x+2}} + 2^{x^3+4x-4} \quad (x \in \mathbb{R})$$

*Giải*

$$4^{2x+\sqrt{x+2}} + 2^{x^3} = 4^{2+\sqrt{x+2}} + 2^{x^3+4x-4} \quad (*); \text{ Điều kiện: } x \geq -2.$$

$$(*) \Leftrightarrow 4^{2+\sqrt{x+2}}(2^{4x-4} - 1) - 2^{x^3}(2^{4x-4} - 1) = 0 \Leftrightarrow (2^{4x-4} - 1)(4^{2+\sqrt{x+2}} - 2^{x^3}) = 0$$

Do đó phương trình  $(*)$  có hai trường hợp.

- $2^{4x-4} = 1 \Leftrightarrow 4x-4=0 \Leftrightarrow x=1$  (nhận)

$$\bullet \quad 2^{4+2\sqrt{x+2}} = 2^{x^3} \Leftrightarrow x^3 = 2\sqrt{x+2} + 4 \Leftrightarrow x^3 - 8 = 2(\sqrt{x+2} - 2)$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(x^2 + 2x + 4) = \frac{2(x-2)}{\sqrt{x+2} + 2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \text{ (nhận)} \\ x^2 + 2x + 4 = \frac{2}{\sqrt{x+2} + 2} \end{cases} \quad (1)$$

Nhận xét: Phương trình (1) có:

$$VT = x^2 + 2x + 4 = (x+1)^2 + 3 \geq 3; \quad VP = \frac{2}{\sqrt{x+2} + 2} \leq 1$$

Suy ra phương trình (1) vô nghiệm.

Vậy : (\*) chỉ có hai nghiệm  $x = 1; x = 2$ .

#### Bài 4: CAO ĐẲNG KHỐI A, B, D NĂM 2008

Giải phương trình  $\log_2^2(x+1) - 6\log_2\sqrt{x+1} + 2 = 0$

*Giải*

$$\log_2^2(x+1) - 6\log_2\sqrt{x+1} + 2 = 0 \quad (1)$$

Điều kiện  $x > -1$

$$(1) \Leftrightarrow \log_2^2(x+1) - 3\log_2(x+1) + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_2(x+1) = 1 \\ \log_2(x+1) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = 2 \\ x+1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

#### Bài 5: ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008

Giải phương trình  $\log_{2x-1}(2x^2 + x - 1) + \log_{x+1}(2x - 1)^2 = 4$

*Giải*

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 0 < 2x - 1 \neq 1 \\ 2x^2 + x - 1 > 0 \\ 0 < x + 1 \neq 1 \\ (2x - 1)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x \neq 1$$

$$\log_{2x-1}(2x^2 + x - 1) + \log_{x+1}(2x - 1)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow \log_{2x-1}(2x - 1)(x + 1) + \log_{x+1}(2x - 1)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow 1 + \log_{2x-1}(x + 1) + 2\log_{x+1}(2x - 1) = 4$$

$$\text{Đặt: } t = \log_{2x-1}(x + 1) \Rightarrow \log_{x+1}(2x - 1) = \frac{1}{\log_{2x-1}(x + 1)} = \frac{1}{t}$$

$$\text{Ta có phương trình ẩn } t \text{ là: } 1 + t + \frac{2}{t} = 4 \Leftrightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}$$

- Với  $t = 1 \Leftrightarrow \log_{2x-1}(x+1) = 1 \Leftrightarrow x+1 = 2x-1 \Leftrightarrow x = 2$  (nhận)

- Với  $t = 2 \Leftrightarrow \log_{2x-1}(x+1) = 2 \Leftrightarrow (2x-1)^2 = x+1 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 & (\text{loại}) \\ x=\frac{5}{4} & \end{cases}$

Nghiệm của phương trình là:  $x = 2$  và  $x = \frac{5}{4}$ .

### Bài 6: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2007

Giải phương trình:  $\log_2(4^x + 15 \cdot 2^x + 27) + 2 \log_2 \frac{1}{4 \cdot 2^x - 3} = 0$

*Giải*

Điều kiện:  $4 \cdot 2^x - 3 > 0$ .

Phương trình đã cho tương đương với:

$$\begin{aligned} \log_2(4^x + 15 \cdot 2^x + 27) &= \log_2(4 \cdot 2^x - 3)^2 \Leftrightarrow 5 \cdot (2^x)^2 - 13 \cdot 2^x - 6 = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2^x = -\frac{2}{5} & (\text{loại}) \\ 2^x = 3 & \end{cases} \end{aligned}$$

Do  $2^x > 0$  nên  $2^x = 3 \Leftrightarrow x = \log_2 3$  (thỏa mãn điều kiện)

### Bài 7: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2007

Giải phương trình:  $(\sqrt{2}-1)^x + (\sqrt{2}+1)^x - 2\sqrt{2} = 0$

*Giải*

Đặt  $(\sqrt{2}-1)^x = t$  ( $t > 0$ ), khi đó phương trình trở thành:

$$t + \frac{1}{t} - 2\sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{2} - 1, t = \sqrt{2} + 1$$

Với  $t = \sqrt{2} - 1$  ta có  $x = 1$ . Với  $t = \sqrt{2} + 1$  ta có  $x = -1$ .

### Bài 8: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2006

Giải phương trình:  $2^{x^2+x} - 4 \cdot 2^{x^2-x} - 2^{2x} + 4 = 0$

*Giải*

Phương trình đã cho tương đương với:

$$2^{2x}(2^{x^2-x} - 1) - 4(2^{x^2-x} - 1) = 0 \Leftrightarrow (2^{2x} - 4)(2^{x^2-x} - 1) = 0$$

- $2^{2x} - 4 = 0 \Leftrightarrow 2^{2x} = 2^2 \Leftrightarrow x = 1$ .
- $2^{x^2-x} - 1 = 0 \Leftrightarrow 2^{x^2-x} = 1 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 1$

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm  $x = 0, x = 1$ .

**Bài 9: ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2006**

Giải phương trình:  $3.8^x + 4.12^x - 18^x - 2.27^x = 0$

*Giải*

Phương trình đã cho tương đương với:  $3\left(\frac{2}{3}\right)^{3x} + 4\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - \left(\frac{2}{3}\right)^x - 2 = 0 \quad (1)$

Đặt  $t = \left(\frac{2}{3}\right)^x \quad (t > 0)$ , phương trình (1) trở thành  $3t^3 + 4t^2 - t - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow (t+1)^2(3t-2)=0 \Leftrightarrow t=\frac{2}{3} \quad (\text{vì } t>0).$$

Với  $t = \frac{2}{3}$  thì  $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{2}{3}$  hay  $x = 1$ .

**Bài 10: ĐỀ DỰ BỊ 2**

Giải phương trình:  $\log_5(5^x - 4) = 1 - x$

*Giải*

Điều kiện:  $5^x - 4 > 0 \quad (a)$

- Để thấy  $x = 1$  là nghiệm của (1)
- VT:  $f(x) = \log_5(5^x - 4)$  là hàm số đồng biến
- VP:  $g(x) = 1 - x$  là hàm số nghịch biến

Do đó  $x = 1$  là nghiệm duy nhất của phương trình

**Bài 11:**

Giải phương trình  $2^{x^2-x} - 2^{2+x-x^2} = 3$ .

*Giải*

Đặt  $t = 2^{x^2-x} \quad (t > 0)$

$$2^{x^2-x} - 2^{2+x-x^2} = 3 \Leftrightarrow t - \frac{4}{t} = 3 \Leftrightarrow t^2 - 3t - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 & (\text{loại}) \\ t = 4 & (\text{nhận}) \end{cases}$$

Vậy  $2^{x^2-x} = 2^2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \vee x = 2$ .

**Bài 12:**

Cho phương trình  $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 1 = 0 \quad (2)$ : ( $m$  là tham số).

1/ Giải phương trình (2) khi  $m = 2$ .

2/ Tìm  $m$  để phương trình (2) có ít nhất 1 nghiệm thuộc đoạn  $[1; 3\sqrt{3}]$ .

***Giải***

1/ Khi  $m = 2$  thì phương trình (2) trở thành  $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 5 = 0$

Điều kiện  $x > 0$ . Đặt  $t = \sqrt{\log_3^2 x + 1} \geq 1$

$$(2) \Leftrightarrow t^2 + t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 2 \vee t = -3 \text{ (loại)}$$

- $t = 2 \Rightarrow \log_3 x = \pm\sqrt{3} \Leftrightarrow x = 3^{\pm\sqrt{3}}$

2/  $1 \leq x \leq 3^{\sqrt{3}} \Leftrightarrow 1 \leq \log_3^2 x + 1 \leq 4 \Rightarrow 1 \leq t \leq 2$ .

Phương trình (2) có ít nhất 1 nghiệm thuộc  $[1; 3^{\sqrt{3}}]$

$$\Leftrightarrow 2m = t^2 + t - 2 = f(t) \text{ có nghiệm } t \in [1, 2]$$

Vì  $f$  tăng trên  $[1, 2]$  nên ycbt  $\Leftrightarrow f(1) \leq 2m \leq f(2) \Leftrightarrow 0 \leq m \leq 2$ .

## ✓ **Vấn đề 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT**

### A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

#### BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \quad (1)$$

- Nếu  $a > 1$ : (1)  $\Leftrightarrow f(x) > g(x)$
- Nếu  $0 < a < 1$ : (1)  $\Leftrightarrow f(x) < g(x)$

Tổng quát: •  $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0; a \neq 1 \\ (a-1)(f(x) - g(x)) > 0 \end{cases}$

$$\bullet \quad a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ (a-1)[f(x) - g(x)] \geq 0 \end{cases}$$

#### BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \quad (1)$$

- Nếu  $a > 1$  : (1)  $\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases}$
- Nếu  $0 < a < 1$  : (1)  $\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > f(x) \end{cases}$

### B. ĐỀ THI

#### Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2008

Giải bất phương trình:  $\log_{0,7} \left( \log_6 \frac{x^2 + x}{x + 4} \right) < 0$

*Giải*

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \frac{x^2+x}{x+4} > 0 \\ \log_6 \frac{x^2+x}{x+4} > 0 \end{cases}$$

Bất phương trình tương đương với  $\log_{0,7} \left( \log_6 \frac{x^2+x}{x+4} \right) < \log_{0,7} 1 \quad (1)$

$$(1) \Leftrightarrow \log_6 \frac{x^2+x}{x+4} > 1 \Leftrightarrow \frac{x^2+x}{x+4} > 6 \Leftrightarrow \frac{x^2-5x-24}{x+4} > 0$$

$$\Leftrightarrow -4 < x < -3 \text{ hay } x > 8$$

**Bài 2:** ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2008

Giải bất phương trình:  $\log_1 \frac{x^2-3x+2}{\frac{x}{2}} \geq 0$

*Giải*

$$\text{Điều kiện: } \frac{x^2-3x+2}{x} > 0$$

Bất phương trình tương đương với  $\log_1 \frac{\frac{x^2-3x+2}{x}}{\frac{x}{2}} \geq \log_1 1 \quad (1)$

$$\begin{aligned} (1) \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{x^2-3x+2}{x} > 0 \\ \frac{x^2-3x+2}{x} \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2-3x+2}{x} > 0 \\ \frac{x^2-4x+2}{x} \leq 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} (x^2-3x+2)x > 0 \\ (x^2-4x+2)x \leq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \vee x > 2 \\ x < 0 \vee 2-\sqrt{2} \leq x \leq 2+\sqrt{2} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & 2-\sqrt{2} \leq x < 1 \vee 2 < x \leq 2+\sqrt{2}. \end{aligned}$$

**Bài 3:** ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

Giải bất phương trình:  $2\log_3(4x-3) + \log_{\frac{1}{3}}(2x+3) \leq 2$

*Giải*

$$\text{Điều kiện: } x > \frac{3}{4}. \text{ Bất phương trình đã cho} \Leftrightarrow \log_3 \frac{(4x-3)^2}{2x+3} \leq 2$$

$$\Leftrightarrow (4x - 3)^2 \leq 9(2x + 3) \Leftrightarrow 16x^2 - 42x - 18 \leq 0 \Leftrightarrow -\frac{3}{8} \leq x \leq 3$$

Kết hợp điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là:  $\frac{3}{4} < x \leq 3$ .

#### Bài 4: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2006

Giải bất phương trình:  $\log_5(4^x + 144) - 4 \log_5 2 < 1 + \log_5(2^{x-2} + 1)$ .

*Giải*

Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\log_5(4^x + 144) - \log_5 16 < 1 + \log_5(2^{x-2} + 1) \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow \log_5(4^x + 144) < \log_5 16 + \log_5 5 + \log_5(2^{x-2} + 1)$$

$$\Leftrightarrow \log_5(4^x + 144) < \log_5[80(2^{x-2} + 1)]$$

$$\Leftrightarrow 4^x + 144 < 80(2^{x-2} + 1) \Leftrightarrow 4^x - 20 \cdot 2^x + 64 < 0$$

$$\Leftrightarrow 4 < 2^x < 16 \Leftrightarrow 2 < x < 4$$

#### Bài 5: ĐỀ DỰ BỊ 2

Giải phương trình:  $\log_5(5^x - 4) = 1 - x$

*Giải*

Điều kiện:  $5^x - 4 > 0 \quad (\text{a})$

- Để thấy  $x = 1$  là nghiệm của (1)

- VT:  $f(x) = \log_5(5^x - 4)$  là hàm số đồng biến

- VP:  $g(x) = 1 - x$  là hàm số nghịch biến

Do đó  $x = 1$  là nghiệm duy nhất của phương trình.

#### Bài 6:

Giải bất phương trình:  $\log_x \left[ \log_3(9^x - 72) \right] \leq 1$

*Giải*

$$\begin{aligned} \text{Điều kiện } & \begin{cases} 0 < x \neq 1 \\ 9^x - 72 > 0 \\ \log_3(9^x - 72) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > \log_9 73 \end{aligned}$$

Bất phương trình  $\Leftrightarrow \log_3(9^x - 72) < x \quad (\text{Vì } x > \log_9 73 > 1)$

$$\Leftrightarrow 9^x - 3^x - 72 < 0 \Leftrightarrow -8 \leq 3^x \leq 9 \Leftrightarrow x \leq 2$$

Kết hợp với điều kiện ta được  $\log_9 73 < x \leq 2$ .

✓ **Vấn đề 3:** **HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT**

**A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI**

Thường sử dụng phương pháp biến đổi từng phương trình trong hệ, sau đó dùng phương pháp thế để tìm nghiệm.

**B. ĐỀ THI**

**Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2010**

Giải hệ phương trình:  $\begin{cases} \log_2(3y-1) = x \\ 4^x + 2^x = 3y^2 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$

*Giải*

Điều kiện:  $3y - 1 > 0$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \begin{cases} \log_2(3y-1) = x \\ 4^x + 2^x = 3y^2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3y-1 = 2^x \\ 4^x + 2^x = 3y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2^x+1}{3} \\ 4^x + 2^x = 3y^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2^x+1}{3} \\ 3(4^x + 2^x) = (2^x+1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2^x+1}{3} \\ 2 \cdot 4^x + 2^x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2^x+1}{3} \\ (2^x+1)(2^x - \frac{1}{2}) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2^x+1}{3} \\ 2^x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ (nhận)} \end{aligned}$$

**Bài 2: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2010**

Giải hệ phương trình:  $\begin{cases} x^2 - 4x + y + 2 = 0 \\ 2\log_2(x-2) - \log_{\sqrt{2}}y = 0 \end{cases}$

*Giải*

$$\begin{cases} x^2 - 4x + y + 2 = 0 & (1) \\ 2\log_2(x-2) - \log_{\sqrt{2}}y = 0 & (2) \end{cases}; \text{ Điều kiện: } x > 2, y > 0$$

$$(2) \Leftrightarrow (x-2)^2 = y^2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = x-2 \\ y = 2-x \end{cases}$$

- $y = x-2$ : (1)  $\Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \text{ (loại)} \\ x=3 \Rightarrow y=1 \end{cases}$

$$\bullet \quad y = 2 - x: (1) \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (loại)} \\ x = 4 \Rightarrow y = -2 \text{ (loại)} \end{cases}$$

Vậy hệ có một nghiệm  $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$ .

### Bài 3: ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009

Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \log_2(x^2 + y^2) = 1 + \log_2(xy) \\ 3^{x^2 - xy + y^2} = 81 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$
---

*Giải*

Với điều kiện  $xy > 0$  (\*), hệ đã cho tương đương:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy \\ x^2 - xy + y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ y^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ y = \pm 2 \end{cases}$$

Kết hợp (\*), hệ có nghiệm:  $(x; y) = (2; 2)$  và  $(x; y) = (-2; -2)$

### Bài 4: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2006

Chứng minh rằng với mọi  $a > 0$ , hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:

$$\begin{cases} e^x - e^y = \ln(1+x) - \ln(1+y) \\ y - x = a \end{cases}$$

*Giải*

Điều kiện:  $x, y > -1$ . Hệ đã cho tương đương với:

$$\begin{cases} e^{x+a} - e^x + \ln(1+x) - \ln(1+a+x) = 0 & (1) \\ y = x + a & (2) \end{cases}$$

Hệ đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm duy nhất trong khoảng  $(-1; +\infty)$ .

Xét hàm số  $f(x) = e^{x+a} - e^x + \ln(1+x) - \ln(1+a+x)$  với  $x > -1$ .

Do  $f(x)$  liên tục trong khoảng  $(-1; +\infty)$  và  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

nên phương trình  $f(x) = 0$  có nghiệm trong khoảng  $(-1; +\infty)$ .

$$\text{Mặt khác: } f'(x) = e^{x+a} - e^x + \frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+a+x}$$

$$= e^x(e^a - 1) + \frac{a}{(1+x)(1+a+x)} > 0, \quad \forall x > -1$$

$\Rightarrow f(x)$  đồng biến trong khoảng  $(-1; +\infty)$ .

Suy ra phương trình  $f(x) = 0$  có nghiệm duy nhất trong khoảng  $(-1; +\infty)$ .

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất.

**Bài 5: ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2005**

Giải hệ phương trình:  $\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{2-y} = 1 \\ 3\log_9(9x^2) - \log_3 y^3 = 3 \end{cases}$

*Giải*

$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{2-y} = 1 & (1) \\ 3\log_9(9x^2) - \log_3 y^3 = 3 & (2) \end{cases}. \quad \text{Điều kiện: } \begin{cases} x \geq 1 \\ 0 < y \leq 2 \end{cases}$$

$$(2) \Leftrightarrow 3(1 + \log_3 x) - 3\log_3 y = 3 \Leftrightarrow \log_3 x = \log_3 y \Leftrightarrow x = y.$$

Thay  $y = x$  vào (1) ta có

$$\begin{aligned} \sqrt{x-1} + \sqrt{2-x} &= 1 \Leftrightarrow x-1+2-x+2\sqrt{(x-1)(2-x)}=1 \\ \Leftrightarrow \sqrt{(x-1)(2-x)} &= 0 \Leftrightarrow x=1, x=2. \end{aligned}$$

Kết hợp với điều kiện (\*) hệ có hai nghiệm là  $(x; y) = (1; 1)$  và  $(x; y) = (2; 2)$ .

**Bài 6: ĐỀ DỰ BỊ 1 - ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2005**

Tìm  $m$  để hệ phương trình sau có nghiệm:

$$\begin{cases} 7^{2x+\sqrt{x+1}} - 7^{2+\sqrt{x+1}} + 2005x \leq 2005 & (1) \\ x^2 - (m+2)x + 2m + 3 \geq 0 & (2) \end{cases}$$

*Giải*

Điều kiện  $x \geq -1$ .

Ta có: (1)  $\Leftrightarrow 7^{2x+\sqrt{x+1}} - 7^{2+\sqrt{x+1}} \leq 2005(1-x)$

- Xét  $-1 \leq x \leq 1 \Rightarrow 2x \leq 2 \Rightarrow 7^{2x+\sqrt{x+1}} - 7^{2+\sqrt{x+1}} \leq 0 \leq 2005(1-x)$

nên (1) đúng  $\forall x \in [-1; 1]$

- Xét  $x > 1 \Rightarrow 2x > 2 \Rightarrow 7^{2x+\sqrt{x+1}} - 7^{2+\sqrt{x+1}} > 0 > 2005(1-x)$

nên (1) hiển nhiên sai. Do đó (1)  $\Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$

- Vậy hệ có nghiệm khi và chỉ khi: (2) có nghiệm  $\in [-1; 1]$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 3 \geq m(x-2) \text{ có nghiệm } x \in [-1; 1]$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x + 3}{x-2} \leq m \quad (\text{vì } x-2 < 0 \text{ có nghiệm } x \in [-1; 1])$$

Xét hàm  $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x-2}$ ,  $x \in [-1; 1]$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{(x-2)^2}, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{3}$$

$x$	$-\infty$	$-1$	$2 - \sqrt{3}$	$1$	$2$	$2 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	-	-	0
$f(x)$		$-2$	$-2$				$+$

Dựa vào bảng biến thiên hệ có nghiệm  $\Leftrightarrow -2 \leq m$

### Bài 7: ĐỀ DỰ BỊ 1

Giải hệ phương trình:  $\begin{cases} \log_{\frac{1}{4}}(y-x) - \log_4 \frac{1}{y} = 1 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$ .

*Giải*

Điều kiện  $\begin{cases} y > 0 \\ y - x > 0 \end{cases}$

Hệ  $\Leftrightarrow \begin{cases} \log_{\frac{1}{4}}(y-x) + \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{y} = 1 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{y-x}{y} = \frac{1}{4} \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{4}{3}x \\ x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{4}{3}x \\ x^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \text{ (nhận)} \\ y = 4 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -3 \text{ (loại)} \\ y = -4 \end{cases}$$

### Bài 8:

Giải hệ phương trình:  $\begin{cases} 2^{3x} = 5y^2 - 4y \\ \frac{4^x + 2^{x+1}}{2^x + 2} = y \end{cases}$ .

*Giải*

$$\begin{cases} 2^{3x} = 5y^2 - 4y \\ \frac{4^x + 2^{x+1}}{2^x + 2} = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^{3x} = 5y^2 - 4y \\ 2^x = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5y^2 - 4y = y^3 \\ y = 2^x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - 5y + 4 = 0 \\ y = 2^x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$$

### Bài 9: ĐỀ DỰ BỊ 1

Giải hệ phương trình:  $\begin{cases} x - 4|y| + 3 = 0 & (1) \\ \sqrt{\log_4 x} - \sqrt{\log_2 y} = 0 & (2) \end{cases}$

*Giải*

Điều kiện:  $\begin{cases} x \geq 1 \\ y \geq 1 \end{cases}$ .

(2)  $\Leftrightarrow \log_4 x = \log_4 y^2 \Leftrightarrow x = y^2$ . Thay  $x = y^2$  vào (1) ta được:  $y^2 - 4|y| + 3 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |y| = 1 \\ |y| = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 \Rightarrow x = 1 \\ y = 3 \Rightarrow x = 9 \end{cases} \text{(do } y \geq 1)$$

Vậy hệ có 2 cặp nghiệm  $(1; 1)$  và  $(9; 3)$ .